

८) यो औषधि कति पटक कति आज्ञा खाणु पर्दछ ?
यो औषधि वर्षको एक मात्रा लगातार ६ वर्ष सम्म खानु पर्दछ ।

उत्तर अनुसार औषधिको मात्रा

उमेर (वर्षमा)	डी.ई.सी. (१०० मि.ग्रा./सानो चक्की)	मल्बेन्डाजोल (४०० मि.ग्रा./ठूलो चक्की)
२ देखि ५	१ चक्की ०	एक चक्की ०
६ देखि १४	२ चक्की ००	एक चक्की ०
१५ वर्ष माथि	३ चक्की ०००	एक चक्की ०

यो बीसदिने खाना बा मार्ला तर्ने बरफा बाएर फाँडि खानु पर्दछ । खानी घेउया बीसदिने खानु हुँदैन ।

९०) यी औषधिहरू कहाँ कहाँ पाइन्छन् ?

यी औषधिहरू नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष हातिपाइले (फाइलेरिया) रोग निवारण दिवसको दिनमा तालिम प्राप्त औषधि खुवाउने जनशक्ति मार्फत टोलको पाएक पर्ने स्थान वा घर दैलोमा नै उपस्थित भै निःशुल्क खुवाउने गरिन्छ । यो कार्यक्रमको अघि पछि पनि औषधिको आवश्यकता भएमा स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी औषधि पाउन सकिन्छ ।

९१) यो औषधि सेवनाबाट केही असर पलि हुन्छन् की ?

डी.इ.सी र अल्बेन्डाजोल दुवै औषधि राम्रा र सुरक्षित औषधि हुन । यी औषधि सेवन पश्चात कसै कसैलाई सामान्य टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने वा पखाला लाग्ने हुन सक्छ । साथै शरिरमा फाइलेरिया परजिवी भएकाहरूलाई उक्त परजिवीको मृत्यु हुँदा कसै कसैलाई ज्वरो आए जस्तो हुने, टाउको दुख्ने, बाक बाकी लाग्ने, बाल्ना हुने, पेट दुम्र परे जस्तो हुन सक्छ तर यस्ता असर एक दुई दिन पछि स्वतः निको भएर जान्छन् । यस्ता असर देखिएमा औषधि प्रभावकारी छु, शरिरमा भएको परजिवी नष्ट हुदैछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

९२) केही अगाडिखत असर देखियो भने के गर्ने ?

औषधिको अवाञ्छित असरको साथै शरिरमा भएको परजिवीको संख्या कम बढी भए अनुसार अवाञ्छित असर पनि कम बढी नै देखिने गर्दछ । उल्लिखित असरहरू सामान्य छन् भने प्रसस्त पानी पिउने र घरसै आराम गरी वस्तु पर्दछ तर असर अलि बढी देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा सम्पर्क गरी सल्लाह तथा उपचार गर्नु पर्दछ ।

९३) हातिपाइले (फाइलेरिया) रोग निवारण अभियानमा दुवै थरी औषधि किल दिइन्छ ?

दुवै थरी औषधि सँगै/एकै पटक सेवन गर्दा फाइलेरिया परजिवि नष्ट गर्न बढी प्रभावकारी भएको अध्ययनहरूले देखाएको हुँदा यो रोग निवारण कार्यक्रममा दुवै औषधि सँगै प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । आम औषधि सेवनमा दुवै थरी औषधिको प्रयोगबाट घेटमा हुने अन्य जुकाहरूलाई पनि नष्ट गर्ने भएकोले मानव स्वास्थ्यमा थप सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

वर्षको एक मात्रा औषधि लगातार ६ वर्षसम्म सेवन गरी

हातिपाइले (फाइलेरिया) रोग हुनाबाट बचाउ र बचाओ ।

नेपाल र विश्वबाट सबै २०२० सम्मका हातिपाइले (फाइलेरिया) रोग निवारण गरी ।

हातिपाइले (फाइलेरिया) रोग निवारण
कार्यक्रमबारे जानकारी



नेपाल सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य सेवा विभाग

इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

हातिपाइले (फाइलेरिया) रोग निवारण कार्यक्रम

फोन : ४२५५७९६, फ्याक्स : ४२६२२६८

टेकु, काठमाडौं

२०७३

9) **हातीपाइले रोग (लिफ्टयाटिक फाइलेरिया) कस्तो रोग हो ?**

हातीपाइले (फाइलेरिया) सरुवा रोग हो । यो रोग एक प्रकारको मसिनो धागो आकारको उच्चरेरिया ब्रान्कोप्टी नामको परजिवीबाट लाग्दछ । यो परजिवी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा लामबुइको टोकाईबाट सार्ने गर्दछ ।

2) **यो रोग कस्तो व्यक्तिलाई लाग्छ ?**

यो रोग जुनसुकै उमेरको जोसुकैलाई पनि हुन सक्छ । लामबुइको टोकाईबाट रोग सार्ने भएको हुँदा केटाकेटीहरू वढी जोखिमपूर्ण हुन्छन् । तर रोगको लक्षण भने जवान (वयस्क) भएपछि मात्र देखिन सक्छ ।

3) **यो रोगको लक्षणहरू के के हुन् ?**

हातीपाइले (फाइलेरिया) रोगको परजिवी शरीरभित्र भए पनि मानिसहरू बाहिरबाट स्वस्थ नै देखिएका हुन्छन् तर रोगका परजिवीले भित्री अंगहरूलाई बिस्तारै धेरै पुन्याइरहेको हुन्छ । जस्तै: मूगौला खराब भएर पिसाब सम्बन्धी रोग लाग्ने ।

बाहिर देखिने लक्षणहरू :

तल्लाल देखिने लक्षणहरू

- जाडो लागि ज्वरो आउनु र शरीरमा कम्पन हुनु
- लिम्फ नलीहरू सुनिनु रातो भई दुख्नु, हातगोडामा नीलाकाला पसार्हरू देखिनु
- निखाहरू बढ्नु दुख्नु
- पुरुषको अण्डकोष वरपरका नसाहरू फुल्नु/दुख्नु

दीर्घकालिन रूपमा देखिने लक्षणहरू

- अण्डकोष ठूलो हुनु, दुख्नु, निखाहरू भेटिनु, पछि हाइड्रोसिल अर्थात् अण्डकोष वरिपरि पानी भरिनु ठूलो हुनु
- महिलामा यौनाङ्ग अथवा स्तन सुनिनु/दुख्नु
- खुट्टा सुनिएर हातीपाइले हुनु
- हात सुनिनु
- पिसाब सेतो वा रातो आउनु
- लामो समयसम्म सुत्दा सोकी लागिरहनु, दम बढ्नु, रातमा झ्यापिनोफलको मात्रा बढ्नु
- यो रोग लागेपछि बिरामीले दैनिक जीवनका क्रियाकलाप गर्न असक्त (असमर्थ) हुँदै जान्छ । पछि अपाङ्ग समेत हुँदा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूपमा आफू, परिवार अनि समाज तथा देशलाई घण बोझ (भार) पर्ने हुन्छ ।

8) **विश्वमा हातीपाइले (फाइलेरिया) रोगको वस्तुस्थिति :**

हातीपाइले (फाइलेरिया) रोग विश्वका ७० भन्दा वढी मुलुकहरूमा पाइएको छ । यी देशहरूमा वसोवास गर्ने एक अरब चालिस करोड भन्दा वढी मानिसहरू यो रोगबाट संक्रमित भएको अनुमान गरिएको छ । यस मध्ये १.५ करोड मानिसहरूमा हातीपाइले र २.५ करोडमा अण्डकोष तथा यौनाङ्ग सुनिएको पाइएको छ । बाँकी दुई रिहाई मानिसहरूमा (८ करोड) साधारण खाले लक्षणहरू वा बाह्रिरी लक्षणहरू नदेखिएको अवस्थामा छन् । हातीपाइले (फाइलेरिया) रोगबाट प्रभावित मुलुकहरू मध्ये धेरै जसो दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, दक्षिण पूर्व एशिया र परिचमी प्रशान्त एशियाका अधिकांश सर-सफाईको कमी भएका गरिव मुलुकहरू पर्दछन् । चीन, जापान, कोरिया तथा ताइवान लगायतका

देशहरूले हातीपाइले (फाइलेरिया) रोग लाई निवारण गरी सकेका छन् भने श्रीलङ्का, माल्दीभ, थाइल्याण्ड लगायतका देशहरूले आम औषधि सेवनको चरण पूरा गरी निवारणको प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश म्यानमार लगायतका देशहरूमा हाल आम औषधि सेवन अभियान सञ्चालन भई रहेको छ ।

9) **हातीपाइले (फाइलेरिया) रोग निवारण कार्यक्रम के हो र यसका उद्देश्यहरू के के छन् ?**

हातीपाइले (फाइलेरिया) रोग निवारण कार्यक्रम रोगबाट प्रभावित बिरुवाका सबै मुलुकहरूबाट सन् २०२० भित्र हातीपाइले (फाइलेरिया) रोग निवारणार्थ विरुव स्वस्थ संगठनको रणनीति अनुसार ७० भन्दा वढी मुलुकमा संचालन भै रहेको विरुवब्यापी कार्यक्रम हो ।

हातीपाइले रोग निवारण कार्यक्रमका उद्देश्यहरू :

- हातीपाइले (फाइलेरिया) रोग फैलनुबाट रोक्नु र बिरामीको संख्यामा कमी ल्याउनु ।
- हातीपाइले (फाइलेरिया) रोगका बिरामीहरूलाई दीर्घरोग, असक्त र कुरूपता हुनुबाट बचाउनु । एकीकृत भेक्टर व्यवस्थापन (Integrated Vector Management) पनि यो रोग निवारण गर्ने अतिरिक्त रणनीति रहेको छ ।

10) **यो कार्यक्रम अन्तर्गत सृष्टाडले औषधिहरू कुन कुन हुन् ?**

- (क) डी.ई.सी. (डाइइथाइलकार्बामाजिन) चक्की - यो औषधि ५० वर्ष भन्दा अगाडी देखि उपचारार्थ प्रयोगमा आइरहेको औषधि हो ।
- (ख) अलवेन्डाजोल चक्की - यो औषधि पनि २५ वर्ष भन्दा अगाडी देखि पेट र आन्द्रमा हुने विभिन्न खालका जुकाको लागि प्रयोगमा आइरहेको औषधि हो ।

11) **यो औषधि कस कसले सेवन गर्नुपर्ने हो ?**

यो औषधि हातीपाइले (फाइलेरिया) रोगबाट प्रभावित रहेका जिल्ला भित्र बसोवास गर्ने दुई वर्ष मुनिका बच्चाहरू, गर्भवती महिलाहरू, सिकिस्त बिरामीहरू र छारे रोगका बिरामीहरू बाहेक सबै व्यक्तिहरूले सेवन गर्नु पर्ने औषधि हो ।

12) **यो औषधि सेवन गर्नु नहुने अवस्थाहरू निम्नलिखित छन् :**

- क. दुई वर्ष नपुगेका केटाकेटीहरू
- ख. गर्भवती आमाहरू र ७ दिनसम्मका सुत्केरी आमाहरू
- ग. १ सिकिस्त बिरामीहरू (जसले दैनिक क्रियाकलाप गर्न सक्दैन, ओख्छानमा परेको, कुनै कडा रोगको लागि औषधि सेवन गरिरहेको जस्तै-न्यान्सर, मुटु रोगी, कलेजो रोगी, मूगौला रोगी, फोक्सोको दिवर् रोगी, २४ घण्टा भित्रमा ज्वरो आएका मानिसहरू, कडा कुपोषण भएका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू)
- ग. २ छारे रोगका बिरामीहरू